

SORTIE SOMYLA 09 NOVEMBRE 2024

Statut trophique :	Nom latin complet	Famille	Diamètre du support ?	Support ?	Identifiant MNHN (TAXREF)	Taxon - nom(s) vernaculaire(s)	Observation - commentaire	Incertitude de détermination ?
Ectomycorhizienne	Clavulina coraloides (L.) J.Schröt., 1888	Clavulinaceae			40905	Clavaire crêtée	(= <i>C. cristata</i>) blanche, branchue, extrémités en crêtes	
Ectomycorhizienne	Clavulina rugosa (Bull.) J.Schröt., 1888	Clavulinaceae			40912	Clavaire rugueuse	non branchue, blanche, extrémité obtuse, spores subglobuleuses, hyphes bouclées peu évident, basides bisporiques (leg LMora)	
	Coprinopsis melanthina (Fr.) Örstadius & E.L.	Psathyrellaceae			995243		(ex <i>Psathyrella</i>) sporée pâle, cystides utriformes sur l'arête, chap feutré de gris et stipe avec filaments brun gris (leg)	
	Cortinarius (Pers.) Gray, 1821	Cortinariaceae			191175		groupe <i>Telamonia</i>	
Saprotrophe lignicole	Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc., 1877	Crepidotaceae	7,5 à 30 cm	Bois mort cortiqué	33087		en troupe sur tronc mort de feuillu debout, blanche, lames espacées, spores subglobuleuses épineuses, cheilos avec excroissances digitiformes très variables	
Saprotrophe lignicole	Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude, 1857	Crepidotaceae			33112	Crépidote mou	blanche avec couche gélatineuse séparable, qqs mèches brunes dispersées (leg)	
	Favolaschia (Pat.) Pat., 1892	Mycenaceae			804415		<i>Favolaschia claudopus</i> - sur bois mort de feuillu, exotique invasif	
Parasite nécotrophe ou saprotrophe lignicole	Fuscoporia torulosa (Pers.) T.Wagner & M.F.	Hymenochaetaceae			461818		sur souche de feuillu (leg LM), soies hyméniales présentes	
Saprotrophe humicole	Hemimycena cucullata (Pers.) Singer, 1961	Mycenaceae			30733		blanc, aspect de <i>Mycène</i> , lames fines serrées, sur feuillu (leg)	
	Humaria hemisphaerica (F.H.Wigg.) Fuckel,	Pyronemataceae			47843	Pézize hémisphérique	en coupe extérieur brun méchuleux, hyménium gris bleu, spores biguttulées verruqueuses, au sol (leg LM)	
Ectomycorhizienne	Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr., 1838	Hygrophoraceae			30375	Hygrophore à odeur de cossus	odeur chimique, tout blanc, KOH nul sur chap, stipe et lames, chap visqueux, pied poudré à ½, visqueux, sous-bois de feuillus	
Saprotrophe lignicole	Hymenochaete corrugata (Fr.) Lév., 1846	Hymenochaetaceae			42804		sur <i>Corylus</i> , nombreux sclérotés noirs fixant les branches en hauteur, en plaques brun gris sur branches mortes de noisetier, présent partout	
Saprotrophe lignicole	Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév., 184	Hymenochaetaceae	30 cm à 50 cm	Bois décortiqué non pourri	42815		sur souche de <i>Quercus</i> , brun foncé à marge roux vif en croissance	
Saprotrophe lignicole	Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk, 1957	Hyphodermataceae	7,5 à 30 cm	Bois décortiqué pourri	42897		"en croûte blanche sur bois mort décortiqué de <i>Corylus</i> debout, monomitique, boucles aux cloisons, cystides grandes cylindriques septées incrustées, basides tetra, spores cylindriques à lamblement allantoïdes	
Saprotrophe lignicole	Hypholoma fasciculare (Huds.) P.Kumm., 18	Strophariaceae			36977	Hypholome en touffes		
	Hypocreopsis rhododendri Thaxt., 1922	Hypocreaceae			862565		"sur <i>Corylus</i> avec <i>Hymenochaete corrugata</i> sur 3 point différents	
	Inocybe (Fr.) Fr., 1863	Inocybaceae			193604		"sp134 chap conique brun fauve avec mèches, stipe blanc jaunâtre poudré entier, cylindrique, odeur spermatique, cystides métuloïdes sur arête et faces nombreuses partout, spores amygdaliformes lisses	
Saprotrophe lignicole	Irpex bourdotii (Saliba & A.David) Kotir. & Sa	Steccherinaceae	7,5 à 30 cm	Bois mort cortiqué	464764		"sur <i>Corylus</i> , chapeau en consoles bien développés, dents jusqu'à 2mm, teinte des aiguillons moins orangée que ochraceum	
	Lanzia albida (Gillet) S.E.Carp., 1981	Sclerotiniaceae		Feuille (nervure)	855482		(= <i>Hymenoscyphus albidus</i>) - très nombreux sur nervures de feuilles mortes au sol de <i>Fraxinus</i> , apothécies de 1 à 3mm, asques sans crochet, I+ (lugol)	
Saprotrophe lignicole	Lenzites betulinus (L.) Fr., 1838	Polyporaceae	7,5 à 30 cm	Bois mort cortiqué	43251	Lenzite du bouleau	très velouté zoné, pores étirés en lames, sur bois mort de feuillu	
Saprotrophe humicole	Lepiota poliochloodes Vellinga & Huijser, 19	Agaricaceae			464350		(leg LM) chap feutré de gris olive sur fond ochracé, stipe ochracé à guirlandes peu visibles (manipulation)	
Saprotrophe lignicole	Marasmiellus candidus (Fr.) Singer, 1948	Marasmiaceae	0 à 7,5 cm	Branche et brindilles	30946		sur brindille morte de feuillu, chap gaufré entièrement blanc	
Saprotrophe lignicole ou humicole	Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer, 1948	Marasmiaceae	0 à 7,5 cm	Branche et brindilles	30959		sur brindilles mortes de feuillu, chap blanc à ochracé au centre, aspect feutré, stipe prumineux noircissant par le bas	
Saprotrophe lignicole	Marasmiellus virgatoctus Robich, Esteve-Ra	Marasmiaceae	0 à 7,5 cm	Branche et brindilles	464331		sur brindilles mortes de feuillu, blanc gaufré avec petites mèches grises surtout au centre, lames malformées, stipe blanc prumineux, noircissant par la base	
Saprotrophe folicole	Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr., 1838	Marasmiaceae		Feuille (limbe)	31011		greffé sur feuille morte de feuillu, blanc, lames espacées, mal formées, stipe corné brunissant par la base à sommet blanc	
Parasite nécotrophe ou saprotrophe lignicole	Mucidula mucida (Schrad.) Pat., 1887	Physalacriaceae		Bois mort cortiqué	31604	Collybie visqueuse	sur bm de <i>Corylus</i> (leg AMM), blanc visqueux translucide, anneau à dessous noir sur stipe	
Saprotrophe lignicole	Mycena galericulata (Scop.) Gray, 1821	Mycenaceae			31292	Mycène casquée	saveur farineuse nette, lames interveinées, stipe radicant (leg)	
Saprotrophe	Mycena galopus (Pers.) P.Kumm., 1871	Mycenaceae			31298	Mycène à pied laiteux	latex blanc à la piqûre	
Saprotrophe lignicole ou humicole	Mycena polygramma (Bull.) Gray, 1821	Mycenaceae			31393	Mycène à pied strié	stipe strié d'argent	
Saprotrophe lignicole	Mycena pseudocorticola Kühner, 1938	Mycenaceae		Mousse	31403		petit bleu +/- profond sur tronc moussu de feuillu	

Saprotrophe lignicole	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.) Quél., 1872	Mycenaceae		Litière	31545		stipe résistant qui émet un bruit sec à la cassure par traction, cheilos nombreuses en massue avec excroissances digitiformes +/- branchues, litière de feuillus	
Saprotrophe lignicole	<i>Myxarium nucleatum</i> Wallr., 1833	Exidiaceae			43475		"masse translucide blanchâtre avec concrétions blanches calcaire à l'intérieur, sur bois mort de <i>Fraxinus</i> au sol	
Saprotrophe lignicole	<i>Peniophora cinerea</i> (Pers.) Cooke, 1879	Peniophoraceae	7,5 à 30 cm	Bois mort cortiqué	43661		sur bm de feuillu, étalé, fin, aspect poudré, se craquelle au sec	
	<i>Pluteus</i> Fr., 1836	Pluteaceae			196462		(<i>Pluteus</i> cf <i>petasatus</i>) (pas d'échantillon pour contrôler) odeur faible mêlée de rave, de fleur (leg)	Moyenne
Saprotrophe lignicole	<i>Ramaria stricta</i> (Pers.) Quél., 1888	Ramariaceae			41107	Clavaire dressée	passée, sur bois mort de feuillu (leg)	
Saprotrophe lignicole	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad.) Donk, 1967	Schizoporaceae	30 cm à 50 cm	Bois décortiqué pourri	44335		étalé sur bois mort tronc couché de <i>Fagus</i>	
Saprotrophe lignicole	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. ex J.F.Gmel)	Steccherinaceae	0 à 7,5 cm	Bois mort cortiqué	852882		sur bois mort de feuillu, aiguillons orange inférieurs à 2mm de long	
Saprotrophe lignicole	<i>Stereum gausapatum</i> (Fr.) Fr., 1874	Stereaceae			44619		à contrôler (pas d'échantillon), sur bois mort de chêne	Moyenne
Saprotrophe lignicole	<i>Stereum hirsutum</i> (Willd.) Pers., 1800	Stereaceae		Bois mort cortiqué	44622	Stérée hirsute	sur bois mort de feuillus	
Saprotrophe lignicole	<i>Stereum insignitum</i> Quél., 1890	Stereaceae	7,5 à 30 cm	Bois mort cortiqué	44625	Stérée remarquable	sur <i>Fagus</i> , souvent en entonnoir, couleurs chaudes dessus et face inférieure hyménium lisse et brun grisâtre avec marge pâle qui jaunit à la pression (latex jaune)	
Saprotrophe lignicole	<i>Terana caerulea</i> (Lam.) Kuntze, 1891	Phanerochaetaceae	0 à 7,5 cm	Branche et brindilles	44192		sur bois mort de feuillu, étalé à la face inférieure de branches mortes de feuillu, couleur bleu profond - (leg LM)	
Saprotrophe lignicole	<i>Trametes gibbosa</i> (Pers.) Fr., 1838	Polyporaceae			44887	Tramète bossue	pores rectangulaires, face supérieure veloutée, zonée, envahie et verdie par des algues, bosse au point d'insertion, sur bois mort de feuillu	
Saprotrophe lignicole	<i>Trametes versicolor</i> (L.) Lloyd, 1921	Polyporaceae			44911	Tramète à couleur changeante	en consoles, zoné avec des stries foncées, très plat, pores très petits peu visibles à l'œil nu	
Saprotrophe lignicole	<i>Trichaptum bifforme</i> (Fr.) Ryvarden, 1972	Polyporaceae			45029	Tramète parcheminé	en consoles, zoné, pores irréguliers, marge violette sur le frais	