

## FONGE Arjuzanx 5 mars 2025

*Coprinellus saccharinus* (et non micaceus) car il n'a pas de poils à la jambe et les spores sont ovoïdes et non pas en forme de mitre

*Arachnopeziza aurata* discomycète jaune sur un feutrage blanc sur bois mort de feuillu

*Entoloma vernum* sur sol pauvre au printemps, odeur faible non farineuse, spores à 5-7 angles

*Hysterium acuminatum* sur bois mort de feuillu, allongé, noir avec une fente longitudinale qui laisse passer les spores

*Amphinema byssoides* corticié en toile aranéenne jaune avec de petits cratères parsemés sur la surface

*Panaeolus fimicola* dans l'herbe, stipe noir couvert de pruine blanche, présence de chrysocystides

*Lasiosphaeria ovina* sur bois mort, petites sphères noires couvertes d'un tomentum blanc, seul l'ostiole noir émerge au centre

*Scutellinia* en cours de détermination, disques rouges avec poils bruns +/- longs à la marge, sur la terre et souvent sur du bois mort humide

*Suillus granulatus* associé aux pins, gouttes opalescentes puis brunes sur les pores et le stipe, cuticule visqueuse qui était marbrée de brun et de crème à la récolte puis est devenue brun ocre uniforme, la chair est blanche dans le chapeau et jaune dans le stipe. *Suillus bovinus* était là aussi (pas de gouttes ou granulations sur le stipe et pores brun gris larges et irréguliers)



*Amphinema byssoides*



*Arachnopeziza aurata*



*Coprinellus saccharinus*



*Entoloma vernum*



*Hysterium acuminatum*



*Lasiochaeria ovina*



*Panaeolus fimicola*



*Suillus granulatus*

